

Del 1**Oppgave 1** (3 poeng)

Deriver funksjonene

a) $f(x) = 2\cos(\pi x)$

b) $g(x) = \cos^2 x \cdot \sin x$

1 a) $f(x) = 2\cos(\pi x)$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f'(x) = -2\pi \sin(\pi x)}}$$

b) $g(x) = \cos^2 x \cdot \sin x$

Produktregel & kjernerregel:

$$g'(x) = (\cos^2 x)' \cdot \sin x + \cos^2 x (\sin x)'$$

$$= -2\sin x \cdot \cos x \cdot \sin x + \cos^2 x \cdot \cos x$$

$$\underline{\underline{g'(x) = -2\sin^2 x \cdot \cos x + \cos^3 x}}$$

$$(\cos^2 x)'$$

$$= 2\cos x \cdot (\cos x)'$$

$$= 2\cos x \cdot (-\sin x)$$

Oppgave 2 (6 poeng)

Bestem integralene

a) $\int_{-1}^1 (2x^3 + 3x - 1) dx$

b) $\int \frac{8x}{\sqrt{2x^2 - 1}} dx$

c) $\int \frac{2}{(x+3)(x+1)} dx$

$$\underline{2} \text{ a) } \int_{-1}^1 (2x^3 + 3x - 1) dx$$

$$= \underbrace{2 \int_{-1}^1 x^3 dx}_{=0} + \underbrace{3 \int_{-1}^1 x dx}_{=0} - \int_{-1}^1 1 dx = - (1 - (-1)) = \underline{\underline{-2}}$$

fordi x^3 og x er
odde funksjoner over et
symmetrisk intervall.

b) $\int \frac{8x}{\sqrt{2x^2 - 1}} dx$

Kjernerregel: $u = 2x^2 - 1$

$$\Rightarrow \frac{du}{dx} = 4x \Rightarrow \frac{du}{4x} = dx$$

$$= \int \frac{8x}{\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{4x} = \int \frac{2}{\sqrt{u}} du = 2 \int u^{-1/2} du = 2 \left(\frac{1}{1/2} \right) u^{1/2} + C = 4\sqrt{u} + C$$

$$= 4\sqrt{2x^2-1} + C$$

Sjekker svaret ved å derivere:

$$\begin{aligned} (4\sqrt{2x^2-1} + C)' &= 4(\sqrt{2x^2-1})' = 4 \frac{(2x^2-1)'}{2\sqrt{2x^2-1}} \\ &= 4 \frac{4x}{2\sqrt{2x^2-1}} \\ &= \frac{8x}{\sqrt{2x^2-1}} \quad \text{OK!} \end{aligned}$$

$$c) \int \frac{2}{(x+3)(x+1)} dx = \int \left(\frac{-1}{x+3} + \frac{1}{x+1} \right) dx = -\ln|x+3| + \ln|x+1| + C$$

Delbrøkkoppsettning: $\frac{2}{(x+3)(x+1)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+1} \quad | \cdot (x+3)(x+1)$

$$2 = A(x+1) + B(x+3)$$

$$2 = (A+B)x + A+3B$$

$$\Rightarrow A+B=0 \quad \text{og} \quad A+3B=2$$

$$\Rightarrow A = -B \quad \Rightarrow \quad -B + 3B = 2$$

$$2B = 2$$

$$\Rightarrow B = 1 \quad \text{og} \quad A = -1$$

$$\Rightarrow \frac{2}{(x+3)(x+1)} = \frac{-1}{x+3} + \frac{1}{x+1}$$

$$= \ln \left| \frac{x+1}{x+3} \right| + C$$

3**Oppgave 3** (4 poeng)

a) Bestem summen av den aritmetiske rekken

$$7 + 11 + \dots + 479 + 483$$

Den uendelige geometriske rekken $a_1 + a_2 + a_3 + \dots$ konvergerer. Du får vite at $a_2 = 6$ og at summen av rekken er 24.

b) Bestem a_1 .

a)

Aritmetisk rekke: $a_n = a_1 + (n-1)d$

med: $a_1 = 7$ og $d = 11 - 7 = 4$

Så: $a_n = 7 + (n-1) \cdot 4$

Hvilket nummer n er $a_n = 483$ i rekken?

$$483 = 7 + (n-1) \cdot 4$$

$$483 - 7 = (n-1) \cdot 4$$

$$\begin{array}{r} 483 \\ - 7 \\ \hline 476 \end{array}$$

$$\frac{476}{4} = n-1$$

$$119 = n-1$$

$$\underline{n = 120}$$

Så summen er: $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$

$$S_{120} = \frac{a_1 + a_{120}}{2} \cdot 120$$

$$= \frac{7 + 483}{2} \cdot 120$$

$$= \frac{490}{2} \cdot 120$$

$$= 245 \cdot 120$$

$$\underline{\underline{= 29\,400}}$$

$$\begin{array}{r} 245 \cdot 120 \\ 4900 \\ 245 \\ \hline 29400 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 476 : 4 = 119 \\ \begin{array}{r} 4 \\ -4 \\ \hline 36 \\ -36 \\ \hline 0 \end{array} \end{array}$$

b) Geometrisk rekke:

$$S = a_1 + a_2 + \dots$$

$$a_2 = 6 \quad \text{og} \quad S = 24. \quad \text{Vel at } a_n = a_1 \cdot k^{n-1} \text{ for } |k| < 1.$$

$$\text{Så } a_2 = a_1 \cdot k \quad \text{og:} \quad S = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

$$= a_1 (1 + k + k^2 + \dots)$$

$$S = a_1 \left(\frac{1}{1-k} \right) = \frac{a_1}{1-k}$$

$$\text{Altså har vi likningene: } 6 = a_1 \cdot k \quad \text{og} \quad 24 = \frac{a_1}{1-k}$$

$$24(1-k) = a_1 \quad | \cdot k$$

$$24(1-k) \cdot k = a_1 \cdot k$$

$$24(1-k)k = 6$$

$$\downarrow \quad a_1 k = 6$$

$$4(1-k)k = 1$$

$$\Rightarrow -4k^2 + 4k - 1 = 0$$

$$\Rightarrow k = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot (-4) \cdot (-1)}}{2 \cdot (-4)}$$

$$\underline{k = \frac{-4 \pm \sqrt{0}}{-8} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}}$$

$$\text{Så } 6 = a_1 k \Rightarrow 6 = a_1 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{a_1 = 12}}$$

4**Oppgave 4** (4 poeng)

Løs likningene

a) $2\sin(2x) = 1$, der $x \in [0, \pi]$

b) $2\cos^2 x - \cos x = 1$, der $x \in [0, 4\pi]$

a) $2\sin(2x) = 1$ for $x \in [0, \pi]$

$$\sin(2x) = \frac{1}{2}$$


30°-60°-90°-Trekant

Setter $\varphi = 2x$

$$\sin(\varphi) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \text{(I)} \quad \varphi = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$


$$\text{og (II)} \quad \varphi = \left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$
$$= \frac{5\pi}{6} + 2\pi k$$



$$\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$$

$$30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

Enhets-sirkel:

Husk at $\sin(\cdot)$ er symmetrisk om y-aksen:

$$\sin(\varphi) = \frac{1}{2}$$
$$\Rightarrow \sin(\pi - \varphi) = \frac{1}{2}$$

(I) gir oss $\varphi = \frac{\pi}{6} + 2\pi k$

$$2x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k$$

$$x = \frac{\pi}{12} + \pi k \Rightarrow \text{Bare } k=0 \text{ gir oss en løsning } x = \frac{\pi}{12} \text{ som er}$$

innenfor intervallet $x \in [0, \pi]$.

(II) gir oss: $\varphi = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k$

$$2x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k$$

$$x = \frac{5\pi}{12} + \pi k \Rightarrow \text{Bare } x = \frac{5\pi}{12} \text{ er en løsning}$$

⇒

$$\underline{\underline{x \in \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12} \right\}}}$$

b) $2\cos^2 x - \cos x = 1, \quad x \in [0, 4\pi]$

Setter $u = \cos x$

⇒ $2u^2 - u = 1$

$2u^2 - u - 1 = 0$

$$u = \frac{1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1)}}{2 \cdot 2} = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{1 \pm 3}{4} = \begin{cases} \frac{4}{4} = 1 \\ \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Så $u = 1$ eller $u = -\frac{1}{2}$

$\cos x = 1 \Rightarrow x = 0 + 2\pi k \Rightarrow \underline{x = 0, 2\pi, 4\pi}$

$\cos x = -\frac{1}{2}$ Vet at $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$ (fra enhetssirkelen)

$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$


⇒ $\cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$

fordi $\cos(\cdot)$ skifter fortegn når vi spejler den om y-aksen på enhetssirkelen.

Så: $\cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \Rightarrow \underline{x = \frac{2\pi}{3}, \frac{8\pi}{3}}$

og $x = \left(2\pi - \frac{2\pi}{3}\right) + 2\pi k$

$x = \frac{4\pi}{3} + 2\pi k \Rightarrow \underline{x = \frac{4\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}}$



⇒ $\underline{\underline{x \in \left\{ 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, 2\pi, \frac{8\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}, 4\pi \right\}}}$

5

$$f(x) = \sin^2 x$$

$$\Rightarrow f(x) \geq 0 \text{ (aldri negativ!)}$$

Har nullpkt. som $\sin x \Rightarrow x = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$

Graf B

$f(x)$ har toppunkt når $\sin x$ har toppunkt $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$





og når $\sin x$ har bunnpunkt: $x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k$

Oppgave 5 (2 poeng)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \sin^2 x$$

Nedenfor ser du fire grafer. Bestem hvilken av disse som er grafen til f . Begrunn svaret.




6**Oppgave 6** (4 poeng)Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x + a, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad a > 0$$

a) Bestem a slik at arealet under grafen til f blir 3.Grafen til f dreies 360° om x -aksen. Vi får da en rett avkortet kjegle.b) Bestem a slik at volumet av den rett avkortede kjeglen blir $\frac{98}{3}\pi$.

a) $f(x) = x + a$ for $0 \leq x \leq 2, a > 0$



$$A = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 (x + a) dx = \left[\frac{1}{2}x^2 + ax \right]_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 2^2 + 2a = 2 + 2a$$

vil ha $A = 3 \Rightarrow 3 = 2 + 2a$

$$1 = 2a \Rightarrow \underline{\underline{a = \frac{1}{2}}}$$

b) Omdreiningsslegeme: $dV = \pi f^2(x) dx$

$$V = \int_0^2 dV = \int_0^2 \pi f^2(x) dx = \pi \int_0^2 (x + a)^2 dx$$

$$= \pi \int_0^2 (x^2 + 2ax + a^2) dx = \pi \left[\frac{1}{3}x^3 + ax^2 + a^2x \right]_0^2$$

$$= \pi \left(\frac{1}{3} \cdot 2^3 + a \cdot 2^2 + a^2 \cdot 2 \right)$$

$$= \pi \left(\frac{8}{3} + 4a + 2a^2 \right) = \pi \left(\frac{8 + 12a + 6a^2}{3} \right)$$

$$\text{Vil ha: } V = \frac{98}{3}\pi \Rightarrow 8 + 12a + 6a^2 = 98$$

$$12a + 6a^2 = 90$$

$$4a + 2a^2 = 30$$

$$2a + a^2 = 15$$

$$a^2 + 2a - 15 = 0$$

$$(a+5)(a-3) = 0$$

$$\Rightarrow a = -5 \text{ eller } a = 3$$

Altså $a = 3$ (siden vi må ha $a > 0$.)

7

Oppgave 7 (5 poeng)

Den rette linjen ℓ er gitt ved parameterframstillingen

$$\ell: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 6 + t \end{cases}$$

a) Bestem skjæringspunktet mellom linjen ℓ og xz -planet.

Linjen ℓ står vinkelrett på et plan α . Punktet $P(2, -2, 6)$ ligger i planet α .

b) Bestem en likning for planet α .

c) Bestem skjæringspunktet mellom α og ℓ .

2) Et pkt i xz -planet har y -koordinat lik 0.

$\Rightarrow \ell$ skjærer xz -planet for $t=2$:

$$\ell: \begin{cases} x = 1 + 2t = 1 + 2 \cdot 2 = 5 \\ y = 2 - t = 2 - 2 = 0 \\ z = 6 + t = 6 + 2 = 8 \end{cases}$$

$\Rightarrow \ell$ skjærer xz -planet i:

$$P = (5, 0, 8).$$

$$b) \quad l \perp \text{plan } d \Rightarrow \vec{r}_l \parallel \vec{n}_d \quad \text{og} \quad \vec{r}_l = [2, -1, 1]$$

Altså er $\vec{n}_d = \vec{r}_l = [2, -1, 1]$ en normalvektor for planet.

$P(2, -2, 6)$ ligger i planet, altså blir planlikningen:

$$\vec{n}_d \cdot [x-2, y-(-2), z-6] = 0$$

$$2(x-2) - 1 \cdot (y+2) + 1(z-6) = 0$$

$$2x - 4 - y - 2 + z - 6 = 0$$

$$\alpha: \quad \underline{\underline{2x - y + z - 12 = 0}}$$

c) Skjæringspunktet mellom l og d :

l : $P = (1+2t, 2-t, 6+t)$ må passe inn i planlikningen.

$$\alpha: \quad 2x - y + z - 12 = 0$$

$$2(1+2t) - (2-t) + (6+t) - 12 = 0$$

$$\cancel{2} + 4t - \cancel{2} + t + 6 + t - 12 = 0$$

$$6t - 6 = 0$$

$$\underline{\underline{t = 1}}$$

Altså er skjæringspunktet $P = (1+2t, 2-t, 6+t)$

$$= (1+2 \cdot 1, 2-1, 6+1)$$

$$\underline{\underline{= (3, 1, 7)}}$$

8**Oppgave 8** (4 poeng)

Vi har gitt differensiallikningen

$$y' - 2y = x, \quad y(0) = 1$$

a) Løs differensiallikningen.

b) Bestem likningen for tangenten til grafen til y i punktet $(0, 1)$.

$$a) \quad y' - 2y = x, \quad y(0) = 1$$

$$\text{Integrerende faktor: } e^{\int -2 dx} = e^{-2x}$$

$$y' - 2y = x \quad | \cdot e^{-2x}$$

$$e^{2x} y' - 2e^{2x} y = x e^{-2x}$$

$$(y e^{-2x})' = x e^{-2x}$$

$$y e^{-2x} = \int x e^{-2x} dx$$

$$\begin{aligned} \int \underset{u}{x} \underset{v'}{e^{-2x}} dx &= \left| \begin{array}{l} \text{Delvis integrasjon:} \\ u = x \quad u' = 1 \\ v' = e^{-2x} \Rightarrow v = \frac{-1}{2} e^{-2x} \end{array} \right| = uv - \int u'v dx \\ &= \frac{-1}{2} x e^{-2x} - \int \frac{-1}{2} e^{-2x} dx \\ &= \frac{-1}{2} x e^{-2x} + \frac{1}{2} \frac{-1}{2} e^{-2x} + C \\ &= \frac{-1}{2} x e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} + C \end{aligned}$$

$$\text{Så: } y e^{-2x} = \int x e^{-2x} dx$$

$$y e^{-2x} = \frac{-1}{2} x e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} + C$$

$$y(x) = \frac{-1}{2} x - \frac{1}{4} + C e^{2x}$$

$$\text{Og siden } y(0) = 1 \Rightarrow y(0) = 0 - \frac{1}{4} + C = 1$$

$$\Rightarrow C = 1 + \frac{1}{4} \Rightarrow C = \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{y(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + \frac{5}{4}e^{2x}}}$$

b) Tangenten til y i punktet $(0,1)$

Tangenten har stigningstall y' .

$$y' - 2y = x$$

$$\Rightarrow y' = x + 2y$$

$$y' = 0 + 2 \cdot 1 = 2 \text{ i punktet } (0,1)$$

Stipunktformel: $y - y_0 = a(x - x_0)$

$$y - 1 = 2(x - 0)$$


$$\underline{\underline{y = 2x + 1}}$$

2

Oppgave 9 (2 poeng)

Punktene $A(1, -1, 0)$, $B(1, 2, 4)$ og $C(5, 1, -4)$ er sentrum i hver sin kuleflate. De tre kuleflatene tangerer hverandre.

Bestem radien til hver av de tre kulene.



$$\vec{AB} = [1-1, 2-(-1), 4-0]$$

$$= [0, 3, 4]$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 4^2} = 5$$

$$\vec{BC} = [5-1, 1-2, -4-4]$$

$$= [4, -1, -8]$$

$$|\vec{BC}| = \sqrt{4^2 + 1^2 + 8^2}$$

$$= \sqrt{81} = 9$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ + 1 \\ + 64 \\ \hline = 81 \end{array}$$

$$\vec{CA} = [5-1, 1-(-1), -4-0]$$

$$= [4, 2, -4]$$

$$|\vec{CA}| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 4^2}$$

$$= \sqrt{36} = 6$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ + 4 \\ + 16 \\ \hline = 36 \end{array}$$

At de tre kuleflatene tangerer gir oss likningene:

$$R_A + R_B = |\vec{AB}|$$

$$R_A + R_C = |\vec{AC}|$$

$$R_B + R_C = |\vec{BC}|$$

Så:

$$(I) \quad R_A + R_B = 5$$

$$(II) \quad R_A + R_C = 6$$

$$(III) \quad R_B + R_C = 9$$

$$(II) - (I): \cancel{R_A} + R_C - \cancel{R_A} - R_B = 6 - 5$$

$$(*) \quad R_C - R_B = 1$$

$$(*) + (III): R_C - \cancel{R_B} + \cancel{R_B} + R_C = 1 + 9$$

$$2R_C = 10$$

$$\underline{R_C = 5}$$

$$(II) \quad \underline{R_A = 6 - R_C = 6 - 5 = 1}$$

⇓

$$(I) \quad \underline{R_B = 5 - R_A = 5 - 1 = 4}$$

Så radiene i de to kalene er:

$$R_A = 1, R_B = 4, \text{ og } R_C = 5$$

10

Oppgave 10 (2 poeng)

Bruk induksjon til å vise at $n^3 - n$ er delelig med 3 for alle $n \in \mathbb{N}$.

Anta at $n^3 - n$ er delbar med 3 for $n=k$.

Vil vise at dette impliserer at $n^3 - n$ er delbar med 3 også for $n=k+1$.

$$\begin{aligned}(k+1)^3 - (k+1) &= (k+1)(k+1)^2 - k - 1 \\&= (k+1)(k^2 + 2k + 1) - k - 1 \\&= k^3 + 2k^2 + k + k^2 + 2k + 1 - k - 1 \\&= k^3 + 3k^2 + 3k - k \\&= \underbrace{k^3 - k}_{\text{er delbar med 3}} + \underbrace{3(k^2 + k)}_{\text{er delbar med 3}}\end{aligned}$$

\Rightarrow hvis $n^3 - n$ er delbar med 3 for $n=k$, så er $n^3 - n$ også delbar med 3 for $n=k+1$.

Sjekk at $n^3 - n$ er delbar med 3 for $n=1$:

$$1^3 - 1 = 0, \text{ som er delbar med 3.}$$

\Rightarrow $n^3 - n$ er delbar med 3 for alle $n \in \mathbb{N}$.