

VURDERINGSSKJEMA for sentralt gitt skriftlig eksamen i **MAT1019 Matematikk 1P**

Våren 2022

Fagkode: MAT1019

Fagnavn: Matematikk 1P

Gruppe:

Sensor: Farhan Omar, 19.06.2022 Bergen

Kand.nr: PrivatistSRB	Del 1	Oppgave	1a	1b	2	3a	3b	4a	4b	5	6																	SUM DEL 1	TOTALT 42 AV 61
		Poeng	1	2	2	1	1	2	1	3	3																	16	
		Sensors poeng	1	2	1	0	0	2	1	0	3																	10	
	Del 2	Oppgave	1a	1b	1c	1d	1e	2a	2b	2c	3	4a	4b	5	6a	6b	6c	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8c	SUM DEL 2		
		Poeng	2	2	2	2	2	1	2	2	4	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	3	2	45		
		Sensors poeng	2	2	1	0	2	1	1	1	3	2	2	2	0	0	0	2	1	1	1	2	1	1	3	1	32		

SAMLET VURDERING (Se Eksamensveiledning LK20)																											
Kompetanse			2	3/4	5/6	Kommentarer:																					
Begreper og ferdigheter						Selv om du har kontroll på flere områder men du har flere sluvrefell og av og til ekstra unødvendig info og du forklarer ikke hva du gjør i geogebra . Ifølge sensorveiledning og karaktergrenser blir 4 riktig karakter egentlig.																					
Sammenhenger og anvendelser																											
Utforsking og problemløsning																											
Resonnering og kommunikasjon																											
Karakterforslag																											
Eget karakterforslag																											
Medsensors forslag																											
Endelig karakter																											

✓? 2)

1 eller 2
poeng

Den prosentvise økningen er størst fra år 2018 til 2019. Dette er fordi en økning fra 600 til 700 er prosentvis større enn fra 700 til 800.

Hvorfor du valgte de to intervallene? Du skal vel sammenligne all.

Prosentvis økning = $(\text{Ny verdi} - \text{Gammel verdi}) / \text{Gammel verdi} \cdot 100$

Siden det er samme økning fra et år til et annet år så telleren er det samme og da velger vi den med minst nevner altså fra 2018 til 2019 siden den har minst gammel verdi (700)

oppgave 1

✓ ① a) 0,2 prosentpoeng steg renten.

b) prosenten steg med 10. Renten steg 10 prosent,

~~0,022~~ $0,022 = 0,020 \cdot X$

~~1~~
5

~~2,2%~~

$$\frac{0,022}{0,020} = X$$

$$X = 1,1 \text{ vekstfaktoren er } 1,1.$$

Det betyr at prosentvis vekst er 10%.

③

proporsjonale

To str.

Proporsjonal og ikke omvendt proporsjonal

Hyttepris 4000,-

Personer som er med, Her er priser på hytta og antall personer som er med omvendt proporsjonal.


Jo flere som blir med og deler på summen, jo mindre må per person betale.

Prisen går ned per hode når per hode øker. proporsjonal, men omvendt når ^{verdi} går opp ^{annet} verdi går ned. x går opp y går ned

b) str x og str y

x	1	2	4	8
$f(x)$	4000	2000	1000	500

1 sammenheng.
 $f(x)$ pris per hode



4)

$$V(x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x ; 0 < x < 10$$

x cm høy. $x \neq$ høyde.

$$a) V(5) = 4 \cdot 5^3 - 100 \cdot 5^2 + 600 \cdot 5 = 4 \cdot 125 - 100 \cdot 25 + 600 \cdot 5$$

$$V(5) = 500 - 2500 + 3000 = 1000$$

Volumet av ~~esten~~ ^{stein} blir 1000 cm^3 dersom Siri lager
den 5 cm høy.

b) Siri finner høyden på ~~esten~~ når volumet
er 500 cm^3

⑤

Startverdien er 2600

• år + 1

Eleven ønsker å finne verdien etter x antall år, altså hvert år fra år null til verdien/antallet har blitt doblet.

Det som vil ske når programmet kjøres er at eleven får verdien for alle år etter år null og hvilket år det er tillegg hvilket år verdien er for. Men dette er da forbeholdt at verdien er under 4000,-. Så eleven får printet ut / kjørt ut verdien for hvert år frem i tid til det forbeholdt når den er under 4000.

Når verdien er under startverdi $\cdot 2$

print verdien er verdi ganget med 1,05 som er vekst faktoren

år = år + 1

Dette er besvarelsen

print(verdi)

2000 $\cdot 1,05$ år

→

Korrekt spør: Vi legger inn år


Så her finner man verdien et år etter år null når det

er \geq startverdien $\cdot 2$, mindre enn

Finner verdien året etter når den er under 4000,-

0 + 1 året etter.

6)



$$432 \text{ cm}^2$$

$$12 \cdot 3 \cdot 12 = 36 \cdot 12 = \underline{\underline{432 \text{ cm}^2}}$$

$$3x \cdot x = 432 \text{ cm}^2$$

$$\frac{3x^2}{3} = \frac{432 \text{ cm}^2}{3}$$

$$\underline{\underline{x = 12}}$$

$$432 : 3 = \underline{\underline{144}}$$

$$\begin{array}{r} -3 \\ 13 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \\ \underline{00} \end{array}$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{144}$$

$$\underline{\underline{x = 12}}$$

Rektangel ist 12 cm breit.

Oppgave 1

a)

$V(0) = 2000$, det betyr at det før tapping er 2000 liter vann. Mengde vann som er tilgjengelig for tapping er 2000 liter. Startverdi er 2000 liter, ved 0 minutter før tapping er det 2000 liter vann i tanken.

✓?

b)

Funksjonen er definert for verdier av x mellom 0 og 40 (minutter)

$V(x)$ kan bare få verdier som er lik eller lavere enn 2000, det kan ikke bli et negativt tall.

Verdimengden til V blir da $\{2000, 0\}$, altså verdimengden til V er alle tall som er lik eller mindre enn 2000 og lik eller større enn 0.

$\{2000, 0\}$ betyr en liste med to tall som er 0 og 2000

$[0, 2000]$ intervallet fra 0 til 2000 som er verdimengden.

c)

$V(x) = 1000$

Du tastet inn funksjonen feil men riktig strategi så du får 1 poeng

CAS	
1	$V(x) := 2000 - ((2000) * (1(x/40)))^2$ $\rightarrow V(x) := -\frac{5}{4}x^2 + 2000$
2	$f(x) := \text{Funksjon}(V, 0, 40)$ $\rightarrow f(x) := \text{Dersom} \left(0 \leq x \leq 40, -\frac{5}{4}x^2 + 2000 \right)$
3	$-5 / 4 x^2 + 2000 = 1000$ NLøs: $\{x = -28.28, x = 28.28\}$

Det tar 28,28 minutter før halvparten av vannet er tappet ut av tanken


Du skal ikke finne tangent men stigningstallet for en linje som
hår gjennom to punkter (gjennomsnittlig vekstfart)

d)

4	$A := (0, V(0))$ → $A := (0, 2000)$
5	$g := \text{Tangent}(A, f)$ → $g : y = 2000$
6	$B := (30, V(30))$ → $B := (30, 875)$
7	$h := \text{Tangent}(B, f)$ → $h : y = -75x + 3125$

Her ser man at det i punktet $(0, V(0))$ det vil si når x er null, når det har gått 0 minutter (før tappingen har starter) ikke er noe som skjer. Når tappingen ikke foregår så er all vann (2000 liter vann) i tanken uten at det er noe som skjer.

I punkt $(30, V(30))$ det vil si når det har gått 30 minutter, så ser man at det er vann som tappes. Akkurat når det har gått 30 minutter så er det 75 liter vann som tapper, i det punktet er «stigningstallet» 75. Det betyr at når det tappes 75 liter vann fra tanken det tredevte (30) minuttet fra start.



e)

8	$V'(x)$ <input type="radio"/> $\rightarrow \frac{-5}{2} x$
9	$V'(x) > 105$ <input type="radio"/> Løs: $\{x < -42\}$
10	$f'(x)$ <input type="radio"/> $\rightarrow \text{Dersom} \left(0 \leq x \leq 40, \frac{-5}{2} x \right)$
11	$f'(x) > 105$ <input type="radio"/> Løs: ?

Det vil ikke tappes ut mer enn 105 liter vann i minuttet. Bruker først $V(x)$ som i dette tilfellet ikke har definert området. Kommer tydelig frem at det er et negativt tall, og man starter fra null min når det gjelder tappingen.

Bruker også $f(x)$ og finner den deriverte større enn 105 og får da ingen løsning. Det vil ikke være mulig å tappe ut mer enn 105 liter i minuttet, har vist det over ved å bruke hele funksjonen uten å definere x , men da også ved å bruke funksjonen hvor x er definert som fom 0 tom 40.

Oppgave2

a)

Grafen til firma A skjærer y akse i punktet $(0,600)$. Det betyr at startprisen for å leie hos firma A er 600,-. Uansett hvor langt Markus kjører må han betale 600 + prisen for antall kilometer han kjører. Konstanten er 600

$ax+b$ er funksjonen for en lineær funksjon hvor b er konstanten.

$ax+600$ står vi med da. Så man man finne stigningen

man kan se at prisen per 25 km er 100 kroner. $100/25 = 4$

Det betyr at det koster 4 kr per kilometer og at 4 er stigningen per x som er kilometer.

Derfor kan man beskrive prisen Markus må betale hos firma A med uttrykket

$$A(x) = 4x + 600$$

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Bruk alltid to punkter for å finne stigning men du tenkte riktig

4 kr per x (kilometer) + konstant 600 kr som er «startpris»

b)

CAS		
1	$b := 900$	
<input type="radio"/>	$\approx \mathbf{b := 900}$	
2	$a := 100/50$	
<input type="radio"/>	$\approx \mathbf{a := 2}$	
3	$f(x) := a x + b$	
<input checked="" type="radio"/>	$\approx \mathbf{f(x) := 2 x + 900}$	
4	$f(50)$	
<input type="radio"/>	$\rightarrow \mathbf{1000}$	

Prisen markus må betale for å kjøre 50km med firma B er 1000 kroner.

CAS	
1	b:=700 → b := 700
2	a:=300/100 → a := 3
3	f(x):=a x + b ≈ f(x) := 3 x + 700
4	f(400) → 1900

Prisen markus må betale for å kjøre 400 km med firma C er 1900 kroner.

Her svarer du egentlig ikke på det de spør om (pris per kilometer) men har gitt deg et poeng .

c)

CAS	
1	FirmaA(x):= 4x + 600 → FirmaA(x) := 4 x + 600
2	FirmaB(x):=2x + 900 → FirmaB(x) := 2 x + 900
3	FirmaC(x):=3x + 700 → FirmaC(x) := 3 x + 700
4	97 *2 → 194
5	FirmaA(194) → 1376
6	FirmaB(194) → 1288
7	FirmaC(194) → 1282

Antar at tur retur blir 19,4 mil som er 194 km.

Du burde satt 194 i funksjonene siden x er målt i km og ikke i mil.

Det firmaet Markus burde leie fra so han betaler minst hos er Firma C. Det vil koste han 1282,- tur retur Bodø – Sulitjelma.

Oppgave 3

Det står ikke noe om prisen til en flaske så har burde du nevnt at du antar at prisen av flasken er 50 kr men riktig strategi og konklusjonen.

CAS	
1	$A = 50 + 25 + 25$ $\approx A := 100$
2	$100/3$ ≈ 33.33
3	$B = 50 * 0.70$ $\approx B := 35$
4	$35/1$ ≈ 35
5	$C = 50 + 50 * 0.25$ $\approx C := 62.5$
6	$62.5/2$ ≈ 31.25
7	$D = 50 * 3$ $\approx D := 150$
8	$150/5$ ≈ 30

Dette er prisen per flaske for hvert av tilbudene.

Det koster med tilbud A 33.33 kroner per flaske

Med tilbud B 35 kroner per flaske

Med tilbud C 31.25 kroner per flaske

Med tilbud D 30 kroner per flaske

Dusjsåpe er forbruksvare og det at man kjøper inn flere såper og sparer på det er ikke helt dumt. For å spare mest burde man benytte seg av tilbud D. Hvorav kostnaden for per dusjsåpe er 30 kroner.

Og hva er neste beste tilbud?

Eg ville gitt deg full uttelling men kan hende at du bare får 3 poeng ut av 4)

Oppgave 4



a)

1 liter = 1000 mL

10 mL /1000= 0.01Liter

1 Liter olje veier ved 22 grader 0.9124 kg. Det betyr at 1000 mL olje ved 22 grader veier 0.9124 og at 1 mL olje ved 22 grader veier 0.9124/ 1000

2	$0.9124/1000$
<input type="radio"/>	≈ 0.0009124

10 mL olje ved 22 grader veier 0.009124 kg.

3	$0.0009124*10$
<input type="radio"/>	≈ 0.009124

1kilo gram = 1000 gram.

4	$0.009124*1000$
<input type="radio"/>	≈ 9.124

10 mL olje ved 22 grader veier 9.124 gram.



b)

556,6 gram

7	$0.0009124 \cdot 100$ $\approx \mathbf{0.09124}$
8	$0.09124 \cdot 1000$ $\approx \mathbf{91.24}$

1dl = 100 ml

Vi kan da finne hva 1 dL olje veier ved å multiplisere kg olje per mL med 100.

I tillegg kan vi finne vekten i gram per dL ved å multiplisere vekten i kilogram med 1000.

Da får vi at vekten i gram per dL av oljen ved 22 grader er 91.24.

Vi vet at oljen i begeret veier 556,6 gram.

9	$556.6 / 91.24$ $\approx \mathbf{6.1}$
---	---

Oljen i begeret er 6.1 dL

✓ Oppgave 5

	A	B	C
1	0	20	40
2	1	2	4

Brukte regresjon til å finne modellen.

CAS	
1	$f(x) := \text{RegEksp}(1)$
<input checked="" type="radio"/>	$\rightarrow f(x) := 1 \cdot 1.035^x$
2	$12 \cdot 60$
<input type="radio"/>	$\rightarrow 720$
3	$f(720)$
<input type="radio"/>	≈ 68719476762.83

I følge modellen vil det etter 12 timer altså 720 minutter være 68719476763 bakterier.

Oppgave 6

- a) Formelen er feil og den gir feil for figur 3 . Altså når differansen mellom antall klosser i to etterfølgende figurer er ikke konstant kan du ikke få en lineær funksjonk

CAS	
1	$f(n) := 4 \cdot n + 1$
<input checked="" type="radio"/>	$\rightarrow f(n) := 4n + 1$
2	$f(0)$
<input type="radio"/>	$\rightarrow 1$
3	$f(4)$
<input type="radio"/>	$\rightarrow 17$

Roar trenger 17 klosser for å lage figur nummer 5

b)

Roar trenger tilsammen 230 klosser for å lage de første 10 figurene

	A	B	C
1	1	1	
2	2	5	
3	3	9	
4	4	13	
5	5	17	
6	6	21	
7	7	25	
8	8	29	
9	9	33	
10	10	37	
11			

Svare er basert på feil formel så kan hende at du får ingen poeng her.

00:19 man. 20. jun.

=

≈

✓

15
3 · 5

(())

7
↙ ↘

x =

x ≈

f'

∫

✖

Funksjon



T



$f(x) = \text{RegPoly}(l1, 3)$



→ $0.33 x^3 + 0.5 x^2 + 0.17 x + 0$

Liste



$l1 = \{(1, 1), (2, 5), (3, 14), (4, 30)\}$



→ $\{(1, 1), (2, 5), (3, 14), (4, 30)\}$

Tall

$a = f(5)$



→ 55

Tekst



b)



1 b)

2 $\sum_{x=1}^{10} f(x)$

→ **1210**

3 c)

4 $\sum_{x=1}^n f(x) = 10000$

NLøs: $\{n = -19.63, n = 17.63\}$

5 $\text{Sum}(f(x), x, 1, 17)$

→ **8721**

Klosselgjen = $10000 - 8721$

6

→ **Klosselgjen = 1279**

7 Han kan lage 17 figurer og har 1279 klosser igjen


	A	B
1	1	1
2	2	5
3	3	9
4	4	13
5	5	17
6	6	21
7	7	25
8	8	29
9	9	33
10	10	37
11	Tot klosser	190

	A	B
1	1	=1+0*4
2	=A1+1	=1+A1*4
3	=A2+1	=1+A2*4
4	=A3+1	=1+A3*4
5	=A4+1	=1+A4*4
6	=A5+1	=1+A5*4
7	=A6+1	=1+A6*4
8	=A7+1	=1+A7*4
9	=A8+1	=1+A8*4
10	=A9+1	=1+A9*4
11	Tot klosser	=SUMMER(B1:B10)
12		



Oppgave 7

a)




CAS	
1	$a := 1.85$ $\rightarrow a := \frac{37}{20}$
2	$b := 0.49$ $\approx b := 0.49$
3	$a * x^{(b)}$ $\approx 1.85 x^{0.49}$

b)


Gyldighetsområdet til modellen i oppgave a er ved oppgitt tid + noen minutter til De skrudde opp varmen og stilte termostaten på 20 grader. Det vil si at det i dette tilfelle ikke vil skal overstige 20 grader. Dette er en oversikt, modell over stigningen til da stopp som er 20 grader.

c)



d)

1	$T2(x) := -18.0874 \cdot 0.98^x$ $\rightarrow T2(x) := \frac{-90437}{5000} \left(\frac{49}{50} \right)^x$
2	$T1(x) := 1.8526x^{0.4892}$ $\rightarrow T1(x) := \frac{9263}{5000} \left(x^{\frac{1}{2500}} \right)^{1223}$



3

☐

$$T1(x)=20$$

$$\rightarrow \frac{9263}{5000} \left(x^{\frac{1}{2500}} \right)^{1223} = 20$$

4

☐

$$9263 / 5000 (x^{(1 / 2500)})^{1223} = 20, x=1$$

$$NLøs: \{x = 129.45\}$$


Det er to forskjellige modeller, den ene er en eksponensialmodell som gir oss informasjon om at y (temp) øker fra -18 grader, men den flater ut mot 0 grader. Den vil aldri oppnå null grader. Det kan man se, T2 går mot null, men den blir aldri null.

T 1 gir oss en mer presis måling av når grafen passerer 20 grader, og vi får da oppgitt antall minutter det tar. 129.45 minutter tar det for å varme opp rommet fra 2 til 20 grader, altså at temperaturen øker med 18 grader.

Den eksponensielle funksjonen gir oss informasjon kun om når temperaturen vil nærme seg 0 grader, altså når det nærmer seg at det har gått opp 18 grader, men vi får da aldri vite når den akkurat blir null grader eller at det akkurat har økt med 18 grader. Den begynner å flate ut og veksten er heller ikke presis veksten / økningen i den første modellen som er «presis» for denne hendelsen.


Skjønner ikke hva du mener her ?!

e)



Løfte opp en funksjon betyr at hver y verdi skal økes med 20 .





6	$T3(x) := 4.1773 * 1.0158^x$	Du skal ha kommet til feil funksjon .Egentlig bør du ikke bruke regresjon her men helst legge 20 til i T2.
<input checked="" type="radio"/>	$\rightarrow T3(x) := \frac{41773}{10000} \left(\frac{5079}{5000} \right)^x$	
7	$T3(4*60)$	
<input type="radio"/>	≈ 179.8315	

I Følge modell T3 (i oppgave oppgitt som T2) vil temperaturen i stua etter 4 timer, (4*60) minutter være 179.83 grader. Denne funksjonen/modellen kan ikke brukes.

Du har kommet til feil modell og da feil temperatur men bruker logikk for å ikke godta svaret så du bør likevel få full uttelling ifølge sensorveiledning men kan hende at du får bare et poeng også.

Oppgave 8

a)

Det er 100 cm tilsammen (1 meter)

10 cm mellom hver tråd

Start tråd er ved 0 cm

2 etter 10 cm fra start

3 20 cm fra start

4 30 cm fra start

5 40 cm fra start

6 50 cm fra start

7 60 cm fra start

8 70 cm fra start

9 80 cm fra start

10 90 cm fra start

11 100 cm fra start

11 tråder har lysgardinet som er på 1 meter (100 cm)

b)

I den siste tråden er det 6 lyspærer (lysgardin på 1 meter)

	T	
1	$18+18+18+3+6$	
<input type="radio"/>	→	63
2	$+63+9+18+18+18$	
<input type="radio"/>	→	126
3	$126+18+18+18+3$	
<input type="radio"/>	→	183
4	$183+6+9+18+18+3+6$	
<input type="radio"/>	→	243
5	$243+9+18+18+18$	
<input type="radio"/>	→	306
6	$306+18+18+18+3$	
<input type="radio"/>	→	363
7	$363+6+9+18+18+3+6$	
<input type="radio"/>	→	423
8	$423+9+18+18+18$	
<input type="radio"/>	→	486
9	$486+18+18+18+3$	
<input type="radio"/>	→	543
10	$543+6+9+18+18+3+6$	
<input type="radio"/>	→	603

Forklar litt hva du gjør i geogebra

c)

	T	
1	$18+18+18+3+6$	$\rightarrow 63$
2	$+63+9+18+18+18$	$\rightarrow 126$
3	$126+18+18+18+3$	$\rightarrow 183$
4	$183+6+9+18+18+3+6$	$\rightarrow 243$
5	$243+9+18+18+18$	$\rightarrow 306$
6	$306+18+18+18+3$	$\rightarrow 363$
7	$363+6+9+18+18+3+6$	$\rightarrow 423$
8	$423+9+18+18+18$	$\rightarrow 486$
9	$486+18+18+18+3$	$\rightarrow 543$
10	$543+6+9+18+18+3+6$	$\rightarrow 603$

Forklar litt hva du gjør i geogebra

11	$603+9+18+18+18$	$\rightarrow 666$
12	$666+18+18+18+3$	$\rightarrow 723$
13	$723+6+9+18+18+3+6$	$\rightarrow 783$
14	$783+9+18+18+18$	$\rightarrow 846$
15	$846+18+18+18+3$	$\rightarrow 903$

Det er 903 lyspærer i lysgarinen på 15 meter

✓ 2 d)

2 meter, 5 meter, 8 meter, 11 meter , 14 meter blant annet. Gardinene med disse målene vil ha 9 lyspærer på den siste tråden.