

## DEL 1

### Uten hjelpemidler

#### Oppgave 1 (4 poeng)

Deriver funksjonene

a)  $f(x) = -3 \cos x$

b)  $g(x) = \sin^2 x$

c)  $h(x) = x^3 \cdot e^{-x}$

#### Oppgave 2 (5 poeng)

Regn ut integralene

a)  $\int_1^2 (x^2 + 2x - 3) dx$

b)  $\int \frac{3x}{x^2 - x - 2} dx$

c)  $\int x \cdot \ln x dx$

#### Oppgave 3 (4 poeng)

a) Bruk en integrasjonsmetode til å vise at  $\int x \cdot e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$

b) Løs differensiallikningen

$$y' + 2xy = 4x, \quad y(0) = 8$$

### Oppgave 4 (3 poeng)

En uendelig geometrisk rekke er gitt ved

$$S(x) = 2 + \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3} + \dots, \quad x \neq 0$$

- a) Bestem konvergensområdet til rekken.
- b) Bestem  $x$  slik at  $S(x) = 4$

### Oppgave 5 (6 poeng)

Punktene  $A(3, 0, 0)$ ,  $B(0, 4, 0)$  og  $C(0, 0, 1)$  er gitt.

- a) Bestem  $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ . Bestem arealet av  $\triangle ABC$ .
- b) Punktene  $A$ ,  $B$  og  $C$  ligger i et plan  $\alpha$ . Bestem likningen for planet  $\alpha$ .

En partikkel starter i origo  $O(0, 0, 0)$ . Etter tiden  $t$  er partikkelen i et punkt  $P$  gitt ved

$$\overrightarrow{OP} = \left[ t, \frac{t^2}{3}, -\frac{t}{4} \right], \quad t \geq 0$$

- c) Hvor lang tid tar det før partikkelen treffer planet  $\alpha$ ? Bestem koordinatene til punktet der partikkelen treffer  $\alpha$ .

### Oppgave 6 (2 poeng)

En tallfølge  $\{a_n\}$  er gitt ved at  $a_1 = -1$  og  $a_{n+1} = a_n + n - 1$


Bruk induksjon til å bevise at  $a_n = \frac{n(n-3)}{2}$ ,  $n \in \mathbb{N}$

### Oppgave 7 (6 poeng)

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = 3 - 3\cos(1 - x^2), \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

- Bestem nullpunktene til  $f$  ved regning.
- Bruk  $f'(x)$  til å bestemme  $x$ -verdien til eventuelle topp- eller bunnpunkter på grafen til  $f$ .
- Nedenfor er det tegnet tre grafer. Én av dem er grafen til  $f$ . Avgjør hvilken. Begrunn svaret.



### Oppgave 8 (4 poeng)

En trigonometrisk formel er gitt ved

$$\cos(u + v) = \cos u \cdot \cos v - \sin u \cdot \sin v$$

- Bruk formelen til å bestemme et uttrykk for  $\cos(2x)$ .
- Skriv uttrykket  $\cos^4 x - \sin^4 x$  så enkelt som mulig.

### Oppgave 9 (2 poeng)

Løs likningen

$$\sin x + \cos x = 1, \quad x \in [0, 2\pi]$$

## DEL 2

### Med hjelpemidler

#### Oppgave 1 (6 poeng)

Roger planlegger en sykkeltur. Han regner med å kunne starte med farten 26 km/h. Etter hvert vil farten avta etter formelen

$$v(t) = 26 - 0,08 \cdot s(t)$$

- $v(t)$  og  $s(t)$  er begge funksjoner som er avhengige av tiden  $t$  målt i timer
- $v(t)$  er farten målt i kilometer per time
- $s(t)$  er den tilbakelagte veilengden målt i kilometer

a) Bestem farten etter 125 km.

Formelen ovenfor kan vi skrive som differensiallikningen

$$s'(t) = 26 - 0,08 \cdot s(t)$$

b) Bestem  $s(t)$  når  $s(0) = 0$ .

c) Hvor langt sykler Roger den første timen? Hvor lang tid bruker han på 125 km?

#### Oppgave 2 (6 poeng)

Hjørnene i en pyramide  $ABCP$  er  $A(0,0,0)$ ,  $B(1,0,-1)$ ,  $C(1,1,0)$  og  $P(t, 2t+1, t^2+2)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .

a) Bestem et uttrykk for volumet  $V(t)$  av pyramiden.

b) Bestem koordinatene til  $P$  slik at  $V(t) = \frac{7}{2}$ .

c) Bestem koordinatene til  $P$  slik at volumet  $V(t)$  blir minst mulig.

### Oppgave 3 (6 poeng)

*London Eye* er et pariserhjul med diameter lik 135 m. En runde tar 30 min. Passasjerene går ombord i pariserhjulet fra en plattform som ligger 2 m over bakkenivå.

Etter  $t$  min fra ombordstigning er en passasjer  $h(t)$  m over bakkenivå. Det kan vises at

$$h(t) = -67,5 \cos\left(\frac{\pi}{15} t\right) + 69,5$$

- a) Bruk graftegner til å tegne grafen til  $h$  for  $t \in [0, 30]$ . Bestem grafisk når passasjerene er 50 m over bakkenivå.
- b) Bestem vendepunktene på grafen til  $h$ .  
Forklar hvilken praktisk informasjon verdiene av  $h'(7,5)$  og  $h'(22,5)$  gir.


### Oppgave 4 (6 poeng)

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = x^2 + ax + b, \quad D_f = \mathbb{R}$$

Tangentene i punktene  $Q(s, f(s))$  og  $R(t, f(t))$  skjærer hverandre i et punkt  $P$ .

Se skisse 1.



Skisse 1

a) Vis at likningene for de to tangentene er


$$g(x) = (a+2s)x + b - s^2 \quad \text{og} \quad h(x) = (a+2t)x + b - t^2$$

b) Bruk CAS til å vise at  $x$ -koordinaten til punktet  $P$  er gitt ved  $x_p = \frac{s+t}{2}$

Den vertikale linjen  $x = x_p$  deler området mellom grafen og tangentene i to områder.

Se skisse 2.

c) Bruk CAS til å vise at arealene av de to områdene er like store for alle verdier av  $a$  og  $b$ .



Skisse 2